

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

Neoxidil 2% oplossing voor cutaan gebruik Minoxidil 2%

Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Dit geneesmiddel kan zonder voorschrift verkregen worden. Desondanks moet u Neoxidil zorgvuldig gebruiken om een goed resultaat te bereiken.

- Bewaar deze bijsluiter. Het kan nodig zijn om deze nog eens door te lezen.
- Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw arts of apotheker.
- Raadpleeg een arts, als u verschijnselen verergeren of niet verbeteren of niet verbeteren na X dagen.
- Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

In deze bijsluiter:

1. Wat is Neoxidil en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat moet u weten voordat u Neoxidil gebruikt
3. Hoe wordt Neoxidil gebruikt
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u Neoxidil
6. Aanvullende informatie

1. WAT IS NEOXIDIL EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

Neoxidil is een oplossing op basis van minoxidil, een stof voor de lokale behandeling van haaruitval of kaalhoofdigheid.

Neoxidil wordt gebruikt voor de lokale behandeling bij volwassenen van één bepaalde vorm van haaruitval (alopecia androgenetica).

De veiligheid en doeltreffendheid werden niet bepaald bij patiënten jonger dan 18 jaar en ouder dan 65 jaar.

2. WAT MOET U WETEN VOORDAT U NEOXIDIL GEBRUIKT

Gebruik Neoxidil niet

- als u allergisch (overgevoelig) bent voor minoxidil, of voor één van de andere bestanddelen van Neoxidil.
- op geïnfecteerde huid, op plaatsen aangetast door psoriasis, ernstige zonnebrand of ernstige verwondingen, gezien het risico van verhoogde absorptie..
- als plots of onverwacht haarverlies optreedt zoals bij zwangere vrouwen of in de periode na de bevalling, of bij aandoeningen, zoals een ontregeling van de schildklier of onregelmatig haarverlies door een ontsteking van de hoofdhuid of als gevolg van de inname van bepaalde geneesmiddelen.
- als u niet zeker weet wat de oorzaak is van uw haarverlies. Raadpleeg dan een arts.

Wees extra voorzichtig met Neoxidil

- wanneer de volgende effecten optreden dient u het gebruik van Neoxidil stop te zetten en de arts te raadplegen:
versneld hartritme of hartkloppingen, ontsteking van het hartzakje met vorming van vochtophoping, onverklaarde snelle gewichtstoename, gezwollen of opgezette handen, enkels of aangezicht, zoutretentie, duizeligheid of bewustzijnsverlies, troebel zicht, optreden of verslechtering van pijn in borst, arm of schouder, tekens van ernstige indigestie of irritatie van de hoofdhuid.
- wanneer huidirritatie optreedt. Dit is echter van voorbijgaande aard.
Indien de irritatie aanhoudt, dient de arts te worden geraadpleegd.
- wanneer u Neoxidil gebruikt, vermijd contact met de ogen en de geïrriteerde huid.
Bij contact de aangeraakte plek overvloedig spoelen met koel water. Indien de irritatie aanhoudt, dient de arts te worden geraadpleegd.
- De veiligheid en de doeltreffendheid van Neoxidil werd niet bepaald bij patiënten jonger dan 18 jaar of ouder dan 65 jaar.
- Neoxidil is uitsluitend bestemd voor uitwendig gebruik. Elke toevallige inname moet onmiddellijk aan de arts of apotheker worden gemeld.
- dit product is ontvlambaar aangezien het alcohol bevat.

Gebruik met andere geneesmiddelen

Vertel uw arts of apotheker als u andere geneesmiddelen gebruikt of kort geleden heeft gebruikt. Dit geldt ook voor geneesmiddelen die u zonder voorschrift kunt krijgen. Gelijktijdig gebruik met bepaalde geneesmiddelen voor lokaal gebruik (bethametasondipropionaat crème 0.05%, tretinoïne 0,05% of anthraline crème) kan de opname van minoxidil in het lichaam beïnvloeden.

Zwangerschap en borstvoeding

Gebruik dit product niet wanneer u zwanger bent of borstvoeding geeft. Vraag uw arts of apotheker om advies voordat u een geneesmiddel gebruikt.

Rijvaardigheid en het gebruik van machines

Duizeligheid en licht gevoel in het hoofd kunnen voorkomen (zie rubriek mogelijke bijwerkingen).

Belangrijke informatie over enkele bestanddelen van Neoxidil

De hulpstof propyleenglycol kan lokale huidirritatie veroorzaken.

3. HOE WORDT NEOXIDIL GEBRUIKT

Volg bij het gebruik van Neoxidil nauwgezet het advies van uw arts. Raadpleeg bij twijfel uw arts of apotheker.

De gebruikelijke dosering is: 1 ml Neoxidil tweemaal per dag, om de 12 uur, op het midden van de kalende hoofdplek aanbrengen en over de aangetaste huid verdelen. Een totale dagdosis van 2 ml niet overschrijden. Neoxidil niet gebruiken op andere lichaamsoppervlakken. Contact met de ogen of andere gevoelige slijmvliezen vermijden. Bij toevallig contact overvloedig spoelen met koel water (zie ook 'Wees extra voorzichtig met Neoxidil'). Om een maximale doeltreffendheid te bekomen, zorg ervoor

dat uw haar en hoofdhuid goed droog zijn vooraleer u Neoxidil aanbrengt. Gebruik geen haardroger. Na gebruik van Neoxidil uw handen zorgvuldig wassen.



Gebruik van de verstuiver met doseerpompje

Verwijder de stop van het flesje en plaats er vervolgens het dopje met de verstuiver op (zie tekening I).

N.B. Bij de eerste aanwending dient men 2 à 3 keer op de drukknop te drukken om het pompje te activeren.



Toepassing:

- Het uiteinde van de verstuiver direct op de te behandelen zone richten en de haren opzij schuiven (zie tekening II). Doe 1 verstuiwing door de drukknop diep in te drukken en verspreid de oplossing door lichtjes met de vingertoppen te masseren.
- Herhaal dit 10 keer, over het geheel van de te behandelen zone, zodat men in totaal 1 ml oplossing aanbrengt (elke verstuiwing komt overeen met 0,1 ml).

Vier tot meer maanden onophoudelijk gebruik kunnen noodzakelijk zijn vooraleer nieuwe haargroei wordt vastgesteld. De omvang en de kwaliteit van de haargroei verschilt van persoon tot persoon. Uit klinische ervaring is gebleken dat het kalingsproces binnen 3 tot 4 maanden na staking van Neoxidil naar de toestand vóór de behandeling is teruggekeerd.

Wat u moet doen als u meer van Neoxidil heeft gebruikt dan u zou mogen

Toevallige inname van Neoxidil door de mond kan de volgende effecten teweegbrengen: versneld hartritme of hartkloppingen, gezwollen of opgezette handen, enkels of aangezicht, duizeligheid of bewustzijnsverlies, troebel zicht, pijn in de borst of tekens van ernstige indigestie. In geval van toevallige inname, onmiddellijk uw arts of apotheker verwittigen.

Bij vermoeden van gebruik van een te grote hoeveelheid of bij abnormaal gebruik, steeds contact opnemen met uw arts, apotheker of het Antigifcentrum tel. 070/245.245.

Wat moet u doen wanneer u bent vergeten Neoxidil te gebruiken

Wanneer u Neoxidil een keer vergeten bent, hervat het gebruik dan zo spoedig mogelijk. Gebruik Neoxidil niet meer dan twee maal per dag.

Als u nog vragen heeft over het gebruik van dit geneesmiddel, vraag dan raad aan uw arts of apotheker

4. MOGELIJKE BIJWERKINGEN

Zoals alle geneesmiddelen kan Neoxidil bijwerkingen veroorzaken, hoewel niet iedereen deze bijwerkingen krijgt.

Lokale bijwerkingen

De meest waargenomen bijwerkingen met Neoxidil zijn milde plaatselijke huidreacties op de hoofdhuid, zoals huidafschilfering, roodheid en branderigheid.

Zeldzame bijwerkingen omvatten ontsteking van het haarzakje, overmatige ongewenste haargroei (op plaatsen buiten de hoofdhuid) en overvloedige talgafscheiding.

In het begin, ongeveer 2-6 weken nadat u met behandeling bent begonnen, kan er haarverlies optreden. De oorzaak daarvan is dat de haarzakjes, die in een "slapende" toestand zijn (oude haren), weer in een actieve groeifase komen (nieuwe haren). Naarmate die nieuwe haren beginnen te groeien, komen de oude haren los van de hoofdhuid, waardoor u haaruitval krijgt.

Algemene bijwerkingen

Minder voorkomende bijwerkingen worden hieronder volgens lichaamssysteem opgesomd :

Huid : specifieke allergische reacties, gezwollen gezicht, netelroos

Ademhalingsstelsel : kortademigheid, allergische neusverkoudheid.

Zenuwstelsel : hoofdpijn, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, zenuwontsteking.

Hart- en bloedvatstelsel : pijn in de borst, lage bloeddruk, hartkloppingen, variaties in de hartfrequentie

Diversen : overgevoeligheid, vochtophoping, troebel zicht.

Wanneer één van de bijwerkingen ernstig wordt of als er bij u een bijwerking optreedt die niet in deze bijsluiter is vermeld, raadpleeg dan uw arts of apotheker.

5. HOE BEWAART U NEOXIDIL

Houd het geneesmiddel buiten het bereik en zicht van kinderen.

Gebruik Neoxidil niet meer na de vervaldatum die staat vermeld op de verpakking na de afkorting 'Exp'. De vervaldatum verwijst naar de laatste dag van die maand.

Bewaren bij kamertemperatuur (15-25°C).

Geneesmiddelen dienen niet weggegooid te worden via het afvalwater of met huishoudelijk afval. Vraag uw apotheker wat u met medicijnen moet doen die niet meer nodig zijn. Deze maatregelen zullen helpen bij de bescherming van het milieu.

6. AANVULLENDE INFORMATIE

Wat bevat Neoxidil

- Het werkzame bestanddeel is minoxidil 2%.
- De overige bestanddelen zijn ethanol, propyleenglycol en gezuiverd water.

Hoe ziet Neoxidil eruit en wat is de inhoud van de verpakking

Neoxidil is een oplossing voor cutaan gebruik in flacons van 60 ml met een verstuiver en doseerpompje.

De kleur van Neoxidil kan variëren van helder, kleurloos tot geelachtig. De kleur zal de effectiviteit van het product niet beïnvloeden.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant

n.v. Galderma Belgilux s.a.

Rijksweg 14

B-2870 PUURS

Tel.: 03/897.19.00

Fax: 03/897.19.19

e-mail: info.be@galderma.com

Fabrikant

Laboratoires Galderma

Zone Industrielle Montdésir

F-74540 Alby-sur-Chéran

Neem voor alle informatie met betrekking tot dit geneesmiddel contact op de houder van de vergunning voor het in de handel brengen.

Praktische tips bij het gebruik van Neoxidil

Moet ik mijn haar wassen vooraleer ik Neoxidil aanbreng?

Neen. Indien u uw haar wenst te wassen doe dit dan vooraleer Neoxidil aan te brengen en gebruik een milde shampoo. Zorg ervoor dat uw haar en hoofdhuid goed droog zijn vooraleer u Neoxidil aanbrengt.

Mag ik haargel, haarspray of schuim gebruiken?

U mag Neoxidil gebruiken samen met haargel, haarspray of schuim. Maar u moet eerst Neoxidil gebruiken, dit laten drogen en vervolgens deze producten aanbrengen. Neoxidil droogt snel.

Mag ik mijn haar kleuren of permanenten als ik Neoxidil gebruik?

U mag uw haar kleuren of permanenten. U moet wel vooraf uw haar en hoofdhuid grondig wassen om te voorkomen dat uw hoofdhuid zou irriteren.

Mag mijn haar nat worden nadat ik Neoxidil heb aangebracht?

U vermijdt best dat uw haar nat wordt nadat u Neoxidil heeft aangebracht. Door douchen of zwemmen zal Neoxidil wegspoelen uit uw haar. U wacht best 4 uur na het aanbrengen van Neoxidil vooraleer het haar nat te maken.

Mag ik mijn haar drogen met een haardroger na het aanbrengen van Neoxidil?

Neen, u mag geen haardroger gebruiken om Neoxidil te drogen. Neoxidil droogt zelf zeer snel. Natuurlijk kan u een haardroger gebruiken na het wassen.

Mag ik zonnen als ik Neoxidil gebruik?

Als u Neoxidil gebruikt mag u zonnen, maar bescherm uw huid voor de zon door het dragen van een hoofddekseel.

Deze bijsluiter is voor de laatste keer goedgekeurd in 11/06/2007.

NOTICE: INFORMATION DE L'UTILISATEUR

Neoxidil 2% solution pour usage cutané Minoxidil 2%

Veillez lire attentivement cette notice avant d'utiliser ce médicament. Elle contient des informations importantes pour votre traitement. Ce médicament est disponible sans prescription médicale. Cependant, utilisez Neoxidil soigneusement afin d'obtenir un bon résultat.

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la relire.
- Si vous avez besoin de plus d'informations et de conseils, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.
- Si les symptômes s'aggravent ou persistent après X jours, consultez un médecin.
- Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

Dans cette notice:

1. Que'est-ce que Neoxidil et dans quel cas est-il utilisé
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser Neoxidil
3. Comment utiliser Neoxidil
4. Quels sont les effets indésirables éventuels
5. Comment conserver Neoxidil
6. Informations supplémentaires

1. QU'EST-CE QUE NEOXIDIL ET DANS QUEL CAS EST-IL UTILISE

Neoxidil est une solution à base de minoxidil, une substance pour le traitement local de chute des cheveux ou de calvitie.

Neoxidil est indiqué dans le traitement local de la chute des cheveux commune chez l'adulte (alopécie androgénétique).

La sécurité et l'efficacité n'ont pas été établies chez les patients de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.

2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER NEOXIDIL

N'utilisez jamais Neoxidil

- si vous êtes allergique (hypersensible) au minoxidil, ou à l'un des autres composants contenus dans Neoxidil.
- sur une peau infectée, aux endroits affectés par du psoriasis, sur les coups de soleil graves ou sur des blessures sévères en raison du risque d'absorption plus élevée.
- dans les cas alopécie apparus brutalement ou de manière inattendue, comme c'est le cas par exemple chez la femme enceinte ou dans la période qui suit l'accouchement, ou encore dans des affections comme un dérèglement de la thyroïde ou en cas de perte irrégulière des cheveux suite à une inflammation du cuir chevelu ou suite à la prise de certains médicaments.

- si vous ne connaissez pas avec certitude la cause de votre perte de cheveux. Dans ce cas consultez un médecin.

Faites attention avec Neoxidil

- si vous éprouvez l'une quelconque de ces réactions: rythme cardiaque accéléré ou palpitations, inflammation du péricarde avec formation de rétention de liquide, gain de poids rapide et inexpliqué, gonflement ou bouffissure des mains, des chevilles ou du visage, rétention du sel, étourdissement ou perte de connaissance, troubles de la vision, apparition ou aggravation de douleur au niveau de la poitrine, du bras, de l'épaule ou signes d'indigestion grave ou irritation du cuir chevelu. Dans ce cas arrêtez l'utilisation de Neoxidil et contactez votre médecin.
- si une irritation passagère de la peau survient. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.
- si vous utilisez Neoxidil, évitez tout contact avec les yeux et la peau irritée. En cas de contact, rincez abondamment la région atteinte à l'eau froide. Si l'irritation persiste, consultez votre médecin.
- La sécurité et l'efficacité du Neoxidil n'ont pas été établies chez les patients de moins de 18 ans ou de plus de 65 ans.
- Neoxidil est exclusivement réservé à l'usage externe. Toute absorption accidentelle doit immédiatement être rapportée au médecin ou au pharmacien.
- Ce produit est inflammable car il contient de l'alcool.

Utilisation d'autres médicaments

Si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, y compris un médicament obtenu sans ordonnance, parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien.

L'administration concomitante de certains médicaments à usage local (crème de dipropionate de bétaméthasone à 0.05%, trétinoïne 0,05% ou crème d'anthraline) peut influencer l'absorption du minoxidil dans l'organisme.

Grossesse et allaitement

Ne pas utiliser ce produit pendant la grossesse ou l'allaitement. Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

Conduite de véhicules et utilisation de machines

Etourdissement et une sensation de tête vide peuvent survenir (voir rubrique Effets indésirables).

Informations importantes concernant certains composants de Neoxidil

La substance propylène glycol peut causer une irritation cutanée.

3. COMMENT UTILISER NEOXIDIL

Respectez toujours la posologie indiquée par votre médecin. En cas d'incertitude, consultez votre médecin ou votre pharmacien.

La dose habituelle est: 1 ml de Neoxidil deux fois par jour, à intervalles de 12 heures, sur le centre de la plaque chauve du cuir chevelu et répartir sur la surface à traiter. Ne pas dépasser une dose journalière de 2 ml. Ne pas appliquer Neoxidil sur d'autres parties du corps. Eviter tout contact avec les yeux ou avec d'autres muqueuses sensibles. En cas de contact accidentel, rincer abondamment à l'eau froide (voir aussi Faites attention avec Neoxidil).

Pour obtenir une efficacité maximale, veillez à ce que votre peau et votre cuir chevelu soient bien secs avant l'application du Neoxidil.

Ne pas se servir d'un sèche-cheveux. Après l'application de Neoxidil, lavez-vous soigneusement les mains.



Utilisation du pulvérisateur avec pompe doseuse

Enlever le capuchon du flacon, puis mettre l'embout pulvérisateur en place (schéma I). N.B.: Pour la première utilisation, presser 2 ou 3 fois sur le bouton poussoir pour amorcer la pompe.



Application

- Orienter l'embout du pulvérisateur directement sur la zone à traiter en écartant les cheveux (voir schéma II). Faire 1 pulvérisation en appuyant à fond sur le bouton poussoir et répartir en massant légèrement du bout des doigts.
- Répéter l'opération 10 fois, pour l'ensemble de la zone à traiter, de manière à appliquer au total 1 ml de solution (chaque pulvérisation correspond à 0,1 ml).

Quatre mois d'usage continu ou plus peuvent s'avérer nécessaires avant de constater une pousse des cheveux. L'importance de cette pousse de cheveux et la qualité du cheveu varie d'une personne à l'autre. Divers rapports ont montré que la calvitie telle qu'elle existait au départ réapparaît dans les 3 à 4 mois qui suivent l'arrêt de l'application de Neoxidil.

Si vous avez utilisé plus de Neoxidil que vous n'auriez dû

L'ingestion accidentelle de Neoxidil par la bouche peut produire les effets suivants: rythme cardiaque accéléré ou palpitations, gonflement ou bouffissure des mains, des chevilles ou du visage, étourdissement ou perte de connaissance, troubles de la vision, douleur au niveau de la poitrine ou signes d'indigestion grave. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement votre médecin ou votre pharmacien.

En cas de doute d'application d'une trop forte quantité ou de toute utilisation anormale, veuillez prendre contact avec le médecin, le pharmacien ou le Centre Anti-Poison tél. 070/245.245.

Si vous oubliez d'utiliser Neoxidil

Si vous avez oublié une fois Neoxidil, continuez le plus vite possible le traitement comme avant. N'utilisez pas Neoxidil plus que deux fois par jour.

Si vous avez d'autres questions sur l'utilisation de ce médicament, demandez plus d'informations à votre médecin ou à votre pharmacien.

4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS

Comme tous les médicaments, Neoxidil est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tous n'y soient pas sujets.

Effets non désirés locaux

Les effets non désirés le plus fréquemment rencontrés avec le Neoxidil sont: des réactions cutanées légères localisées sur le cuir chevelu comme desquamation, rougeur et sensation de brûlure.

Parmi les effets non désirés rares, on trouve une inflammation du follicule pileux, une croissance pileuse exagérée non désirée (sur d'autres zones à l'exception du cuir chevelu) et une sécrétion abondante de sébum. Au commencement, environ 2 à 6 semaines après le début du traitement, une perte de cheveux peut survenir. Ceci résulte du fait que les follicules pileux, qui sont dans un état « dormant » (anciens cheveux) entrent à nouveau en phase de croissance active (nouveaux cheveux). Au fur et à mesure que ces nouveaux cheveux se mettent à pousser, les anciens cheveux se détachent du cuir chevelu, ce qui occasionne la perte de cheveux.

Effets non désirés généraux

Les effets non désirés survenant moins fréquemment sont repris ci-dessous, par système:

Système cutané: réactions allergiques aspécifiques, gonflement du visage, urticaire

Système respiratoire: essoufflement, rhinite allergique

Système nerveux : des maux de tête, des étourdissements, des sensations de tête vide, une inflammation des nerfs.

Système cardio-vasculaire: douleurs dans la poitrine, hypotension, palpitations, variations de la fréquence cardiaque.

Autres: hypersensibilité, œdèmes, des troubles visuels.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si vous ressentez un des effets mentionnés comme étant sérieux, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

5. COMMENT CONSERVER NEOXIDIL

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

Ne pas utiliser Neoxidil après la date de péremption mentionnée sur l'emballage après 'Exp'.

La date d'expiration fait référence au dernier jour du mois.

Conserver à température ambiante (15-25°C).

Les médicaments ne doivent pas être jetés au tout à l'égout ou avec les ordures ménagères.

Demandez à votre pharmacien ce qu'il faut faire des médicaments inutilisés. Ces mesures permettront de protéger l'environnement.

6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Que contient Neoxidil

- La substance active est le minoxidil 2%.
- Les autres composants sont éthanol, propylène glycol et eau purifiée.

Qu'est-ce que Neoxidil et contenu de l'emballage extérieur

Neoxidil est une solution pour usage cutané en flacons de 60 ml avec un pulvérisateur avec pompe doseuse.

Neoxidil est transparente, incolore jusqu'à légèrement jaunâtre. Une légère coloration n'influence pas l'efficacité du produit.

Titulaire d'autorisation de mise sur le marché et fabricant

n.v. Galderma Belgilux s.a.
Rijksweg 14
B-2870 PUURS
Tél. : 03/897.19.00
Fax : 03/897.19.19
e-mail : info.be@galderma.com

Fabricant

Laboratoires Galderma
Zone Industrielle Montdésir
F-74540 Alby-sur-Chéran

Pour toute information concernant ce médicament, contactez le titulaire d'autorisation de mise sur le marché.

Petits conseils pratiques pour l'utilisation du Neoxidil

Dois-je me laver les cheveux avant d'appliquer le Neoxidil ?

Non. Si vous désirez laver vos cheveux, faites-le alors avant l'application du Neoxidil et utilisez un shampoing doux. Veillez à ce que vos cheveux et votre cuir chevelu soient bien secs avant l'application du Neoxidil.

Puis-je utiliser un gel, un spray ou une mousse pour cheveux ?

Vous pouvez utiliser le Neoxidil avec un gel, un spray ou une mousse pour cheveux. Il faudra cependant d'abord utiliser le Neoxidil, le laisser sécher et ensuite appliquer ces produits. Le Neoxidil sèche rapidement.

Puis-je colorer ou permanenter mes cheveux si j'utilise du Neoxidil ?

Vous pouvez colorer ou faire une permanente à vos cheveux. Mais il faudra prélever en profondeur les cheveux et le cuir chevelu pour éviter l'irritation de ce dernier.

Mes cheveux peuvent-ils être mouillés après l'application du Neoxidil ?

Il vaut mieux éviter de mouiller les cheveux après l'application du Neoxidil. En prenant des douches et en nageant, on enlève le Neoxidil des cheveux. Après l'application du Neoxidil, il vaut mieux attendre 4 heures avant de mouiller les cheveux.

Puis-je sécher mes cheveux avec un sèche-cheveux après avoir appliqué le Neoxidil ?

Vous ne pouvez pas utiliser de sèche-cheveux pour sécher le Neoxidil. Le Neoxidil sèche très rapidement tout seul. Mais vous pouvez évidemment utiliser un sèche-cheveux après avoir lavé vos cheveux.

Puis-je prendre un bain de soleil si j'utilise du Neoxidil?

Si vous utilisez du Neoxidil, vous pouvez prendre un bain de soleil, mais protégez votre cuir chevelu des rayons du soleil en portant un couvre-chef.

Que dois-je faire si j'ai omis une seule fois d'appliquer le Neoxidil?

Si vous avez oublié une seule application de Neoxidil, réinstaurer le traitement aussi vite que possible. Ne jamais appliquer de Neoxidil plus de deux fois par jour.

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le 11/06/2007.